

## EERSTE LIJST van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna, sedert de uitgave der «Coleoptera Neer- landica» bekend geworden.

*Cicindela trisignata* Latr. <sup>1)</sup>. Deze, langs de kusten der Middellandsche- en Atlantische <sup>2)</sup> zeeën voorkomende, soort werd door den heer *D. van der Hoop*, in gezelschap van *C. maritima* Latr. vliegende aangetroffen bij Oostvoorne, 13 en 30 Augustus. Een 5tal typische exemplaren werd gevangen.

1) Op blz. 27 der „Coleoptera Neerlandica“, 1ste deel, zou de tabel achter 3 aldus gewijzigd moeten worden:

- 3 Kaaktasters geheel metaalkleurig. Kop weinig breder dan het halsschild . . . . . 4 (3)  
 Kaak- en liptasters, behalve het eindlid, witgeel. Kop, met de zeer sterk uitpuilende oogen, veel breder dan het halsschild. De zijden van het halsschild en de borst vrij lang, de coxae en de dijen dicht wit behaard. Dekschilden met gewone, niet korrelige bestippling. Bovenzijde in kleur met *C. maritima* overeenkomende en even veranderlijk in tint, de stippels der dekschilden op den bodem blauwachtig. Dekschilden met geheel witte epipleuren en 3 smalle, witachtige banden of vlekken, nl. eene halvemaaanvormige schoudervlek, welke zich met haar achtersten tak tot iets over het midden der dekschilden naar binnen buigt, aan het uiteinde iets verbreed en slechts weinig haakvormig gekromd is, een naar buiten sterk gebogen middenband, welke naar binnen tot aan het midden der dekschilden reikt en dan plotseling ver naar achteren haakvormig uitgezakt is, terwijl het uiteinde nabij den naad zich meer of minder verbreed, en eindelijk eene bandvormige topvlek, welke eene, naar voren gerichte haakvormige, voortzetting uitzendt, die nagenoeg in hetzelfde niveau gelegen is als het uiteinde van den middenband; de middenband verbindt zich met een witachtigen randzoom, die meer of minder volkomen tot aan de schouder- en de topvlek doorloopt. Bij eene bij ons niet waargenomen *ab. c. \*subsuturalis* Souverb. verbreedt zich de witachtige bandteekening zoo sterk dat in het uiterste geval de grondkleur alleen om het schildje overblijft. Lengte 9—11 mm. . . 3bis. *trisignata* Latr.
- 4 (3) Liptasters geheel metaalkleurig enz. . . . 1. *campestris* L.  
 Voorlaatste lid der liptasters in den regel niet metaalkleurig enz. . 5(4)
- 5 (4) Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 2. *hybrida* L.  
 Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 3. *maritima* Latr.
- (2) Volgens A. Fauvel: Manche, Carteret!, baie d'Avranches! Cancale! Quiberon! Ile d'Oléron! Gironde, Landes, Biarritz.

**Abax ovalis** Dfts., Gronsveld, Juni.

**Ophonus signaticornis** Dfts., Bunde, Juni.

**Stenolophus teutonus** Schrk., ab. c. **abdominalis** Géné,  
Arnhem en den Haag; ab. c. **hirticornis** Kryn, Arnhem.

**Haliphus lineatocollis** Mrsh., ab. c. **nitidicollis** Jos. Müll.,  
Arnhem.

**Coelambus impressopunctatus** Schall., glanzige wijfjes  
algemeen, doffe wijfjes zeer zeldzaam.

**Hydroporus neglectus** Schaum, Maarsbergen, Mei.

**Aleochara erythroptera** Grav., een onuitgekleurd exemplaar bij  
Meerssen, April.

**Atheta currax** Kr., Tiel, Januari.

**Bryocharis analis** F., ab. c. **merdarius** Gylh., Hilversum, Juli.

**Mycetoporus nanus** Er., ab. c. **piceolus** Rey., den Haag, Maart.

**Lathrobium elongatum** L., ab. c. **fraudulentum** Ganglb., Loos-  
duinen, Mei en bij Breda, Dec. en Januari, in aanspoelsel  
van de Mark.

**Astenus filiformis** Latr., ab. c. **humeralis** Gredl., Arnhem en  
Warnsveld.

**Stenus incanus** Er., Bunde, Juni.

» **palposus** Zett., Ommen, Augustus.

**Bledius femoralis** Gylh., Velp, Mei.

**Oxytelus fulvipes** Er., Nykerk, Mei.

**Anthophagus praeustus** Müll., Vlodrop, Juni.

**Lesteva longelytrata** Goeze, var. **maura** Er., Bunde en Roer-  
mond, Juni.

**Coccinella oblitterata** L., ab. c. **fenestrata** Weise, Plasmolen,  
April.

**Cerophytum elateroides** Latr., een ♀ bij Meerssen, Juni.

**Helodes marginata** F., Bunde, Juni.

**Ptinus coarcticollis** St., Amsterdam, Mei.

**Hydrothassa aucta** F., ab. c. **glabra** Herbst, den Haag.

**Phyllobius pyri** L., var. **artemisiae** Desbr., een aantal exemplaren  
bij Meerssen, Juli.

(deze melanistische vorm is nagenoeg geheel zwart, ook de pooten).

**Cleonus trisulcatus** Herbst., Valkenberg (Limburg), Juni.